

Conferința Națională
“ Metode moderne de prevenire și combatere a
Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale”
București, 22 februarie 2018

**EDUCAȚIA MEDICALĂ PERMANENTĂ A
PERSONALULUI MEDICAL –
ROL MAJOR ÎN PREVENIREA INFECȚIILOR
ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE**

Șef lucr. univ. Dr. Cocuz Marie-Elena

Facultatea de Medicină

Universitatea “Transilvania “ din Brașov

Asistent medical licențiat Toth Cătălina

Cabinet medical stomatologic Brașov

Obiective:

- Evaluarea cunoștințelor asistenților medicali practicieni cu privire la:
 - Importanța igienei mâinilor în procesul de îngrijire medicală a pacienților
 - Tehnicile de spălare corectă a mâinilor
 - Utilizarea corectă a mănușilor de protecție


- Evaluarea nevoii exprimate de instruire periodică în problematica igienei mâinilor.

Material și metodă:


- Aplicarea unui chestionar cu întrebări cu conținutul structurat corespunzător obiectivelor propuse
- Chestionar cu întrebări cu 1- mai multe variante de răspuns, de tip închis sau deschis
- Chestionar anonim
- Lotul de studiu – 100 asistenți medicali practicieni în secții medicale și chirurgicale din cadrul unor spitale din Brașov
- Perioada de studiu – în cursul anului 2016.
- Au fost evaluate răspunsurile corecte (recunoașterea corectă a valorii de adevărat sau fals a răspunsurilor).

Rezultate (1):

Descrierea lotului de studiu:



Rezultate (2):




Rezultate (3):

Considerați că prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) este o obligație zilnică a personalului medical?

a.Da

b.Nu

c.Nu știu




Rezultate (4):

Considerați că mâinile au rol important în transmiterea IAAM ?

a.Da

b.Nu

c.Nu știu




Rezultate (5):

Considerați că regulile de igienă a mâinilor trebuie respectate de către:

a. Personalul medical

b. Pacienți

c. Apartținătorii pacienților




Rezultate (6):

Transmiterea manu-portată se referă la transmiterea germenilor prin:

a.Contact între pacienți

b.Contact între pacienți și persoanele din jurul acestora (personal medical și de îngrijire, familie, aparținători)

c.Intermediul aparatelor, dispozitivelor.




Rezultate (7):

Spălarea simplă corectă a mâinilor :

a.Are rol în eliminarea murdăriei

b.Duce la reducerea florei tegumentare tranzitorii

c.Se realizează cu produs antiseptic.




Rezultate (8):

Pentru a fi eficientă spălarea simplă a mâinilor trebuie să dureze:

a.1-2 minute

b.30-60 secunde

c.5-6 minute.




Rezultate (9):

Dezinfecție igienică corectă a mâinilor se poate realiza:

a. Prin spălare cu apă și săpun

b. Prin frecare cu un produs antiseptic

c. Independent de curățarea mâinilor murdare dacă se folosește un produs antiseptic.




Rezultate (10):

Pentru a fi eficientă dezinfectia igienică prin spălare a mâinilor trebuie să dureze?

a. 1-2 minute

b. 5-6 minute

c. 3-5 minute.




Rezultate (11):

Menționați care din următoarele afirmații este/sunt corecte?

Personalul medical trebuie să își spele mâinile cu apă și săpun:

- a. La intrarea la servicii
- b. După folosirea batistei
- c. După revenirea din vestiar
- d. Înainte de contactul cu fiecare pacient
- e. După contactul cu un pacient cu tegumentele intacte (evaluare puls, tensiune arterială)
- f. După contactul cu obiecte din vecinătatea pacientului
- g. După scoaterea mănușilor nesterile
- h. După administrarea alimentației.




Rezultate (12):

Apreciați care dintre următoarele situații întâlnite în practica medicală pot determina transmiterea agenților etiologici ce pot produce o IAAM:

a.Utilizarea telefonului în timpul examinării unui pacient

b.Utilizarea pixului pentru a face însemnări în documentele medicale în timpul măsurării tensiunii arteriale fără mănuși

c.Trecerea mâinii prin păr sau atingerea feței în timpul măsurării temperaturii pacientului.




Rezultate (13):

Precizați care dintre situațiile de mai jos pot să prezinte risc pentru transmiterea unei infecții nosocomiale?

a.Utilizarea bluzelor sau halatelor de spital cu mâneci lungi

b.Utilizarea bluzelor sau halatelor de spital cu mâneci scurte

c.Purtarea bijuteriilor pe mâini și antebrațe.




Rezultate (14):

Mănușile sterile se folosesc:

a. În timpul toracocentezei

b. La recoltarea exsudatului faringian sau nazal

c. La montarea unei sonde urinare.




Rezultate (15):

Mănușile nesterile se folosesc:

a.La monitorizarea tensiunii arteriale

b.La monitorizarea temperaturii axilare

c.La efectuarea punctiei venoase.




Rezultate (16):

Considerați că aveți nevoie de informații suplimentare privind rolul igienei mâinilor în infecțiile nosocomiale?

a.Da

b.Nu.



Concluzii:

- Conștientizare în ceea ce privește importanța igienei mâinilor în procesul de îngrijire medicală a pacienților.
- Cunoștințe parțial corecte sau insuficiente în ceea ce privește situațiile în care se impune respectarea recomandărilor privind igiena mâinilor, tehnicile de spălare a mâinilor, folosirea mănușilor de protecție.
- Necesitatea evaluării periodice a cunoștințelor teoretice și practice ale asistenților medicali în problematica igienei mâinilor la locul de muncă.
- Educația medicală continuă, cu accent pe practicile de igienă corectă a mâinilor – rol major în prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale.

VĂ MULȚUMESC!